

Dicas sobre desenvolvimento da franga



zucami[®]
POULTRY EQUIPMENT

zucami.com

Problemas que ocorrem durante o período de desenvolvimento das frangas, segundo especialistas, não serão corrigido após o início da postura dos ovos.



Portanto, uma galinha poedeira com boa produção e alta rentabilidade começa com uma franga bem criada e de boa qualidade.

Problemas como baixo número de ovos e má qualidade da casca durante a fase de produção de ovos é frequentemente estão relacionados aos problemas que ocorreram durante o período de crescimento.



Com este artigo a equipe técnica da Zucami pretende apresentar DICAS que ajudam nossos clientes a conhecer o desenvolvimento da franga para enfrentar o grande desafio de obter uma galinha poedeira rentável e de alta produção




As fases de desenvolvimento e a produção das poedeiras adultas

Se durante a fase de desenvolvimento da pintainha ocorrer alguma interferência que a afete, isso dará lugar à uma galinha adulta que não tem reservas corporais e que sofre alterações em alguma das funções de seus órgãos, o que pode prejudicar na produção das poedeiras.



Muitos especialistas apontam que as pintainhas que atingem ou até excedem seu peso corporal durante as fases de desenvolvimento, podem ter um melhor desenvolvimento de todo o seu potencial genético como produtoras de ovos.





De ZERO a SEIS SEMANAS de idade: Sistema imunológico e Digestivo

A maior parte do desenvolvimento do sistema imunológico e órgãos do sistema digestório ocorrem de zero a seis semanas de idade.


- Portanto, se houver problemas durante este período, as aves estarão mais sensíveis à doenças e/ou apresentarão alterações na digestão e absorção da dieta.





De SEIS a DOZE SEMANAS de idade: Reserva óssea e muscular

A pintainha desenvolve a maior parte dos componentes de seu esqueleto e músculos das seis às doze semanas de idade.



Por esta razão, se evitarmos deficiências de crescimento neste período faremos com que as aves tenham reservas nos ossos e nos músculos, o que se refletirá na quantidade de reserva mineral disponível para formação da casca do ovo na idade adulta.



De DOZE A DEZOITO SEMANAS de idade: Sistema reprodutivo e produção de ovos

O trato reprodutivo amadurece e se prepara para a produção de ovos entre as semanas doze e dezoito da vida da ave.



Portanto, eventos estressantes nesse período podem atrasar o início da postura nas aves.



Por outro lado, a proliferação de células adiposas também ocorre nesse período, o ganho de peso excessivo deve ser monitorado, pois pode gerar acúmulo de gordura abdominal.


5

A baixa uniformidade do peso corporal dificulta a alimentação correta do lote

Metas de peso corporal em diferentes pontos de desenvolvimento, serão oferecidas pelo manual de manejo genético das galinhas.

A uniformidade dos pesos corporais em um lote é tão importante quanto atingir o peso alvo.

Causas da má uniformidade:



- Doenças entéricas como Coccidiose, Gumboro, espiroquetosis enteritis virais ou bacterianas.
- Alojamento inadequado que leva à competição por comedouros e bebedores.
- Formulação de ração inadequada ou mal manejo da alimentação.
- Recusa do alimento devido à má qualidade, micotoxinas ou mudanças repentinas nos ingredientes que alteram a microflora intestinal.
- Estresse com vacinação, manejo excessivo das aves, estresse por calor.
- Corte inadequado do bico.
- Mudanças no consumo de água

- Lotes com aves de baixo peso ou com má uniformidade devem permanecer com uma formulação mais rica em nutrientes.
- Deve-se examinar o desenvolvimento do músculo do peito, pois é um bom indicador de que a ave está com desenvolvimento adequado e pode prever a produtividade futura da poedeira.

O crescimento de um lote de pintainhas com a conformação corporal correta e o peso adequado vão garantir uma poedeira adulta altamente produtiva.





zucami.com